



CASTILLA Y LEÓN

PROGRAMA

de vacunación prenatal
frente a la **tosferina**
en Castilla y León

**PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA
POBLACIÓN GENERAL. Junio 2024**


Junta de
Castilla y León

si estás
embarazada,
#vacúnateCyL

¿Qué es la tosferina?

La tosferina es una enfermedad causada por la bacteria *Bordetella pertussis*, que se transmite al toser o estornudar, o al pasar mucho tiempo en contacto directo con una persona infectada.

Afecta al aparato respiratorio (pulmones y vías respiratorias) de forma generalmente leve, pero puede llegar a ser grave en lactantes más pequeños, especialmente en los menores de 2 o 3 meses de edad que aún no han iniciado el calendario de vacunación infantil.

¿Qué síntomas produce?

Los síntomas de la tosferina varían con la edad y los antecedentes de vacunación. Al principio, se manifiesta como un resfriado común (congestión nasal, moqueo, estornudos, tos, fiebre). Más tarde, aparece una tos persistente, con un sonido muy característico, que puede durar varias semanas.

Es una enfermedad habitualmente leve en adolescentes y adultos. Sin embargo, los bebés más pequeños, aún sin vacunar, son un grupo más vulnerable que puede sufrir complicaciones, pudiendo llegar a ser muy graves y, en algún caso, suponer el fallecimiento. Por eso, muchos de los bebés que padecen tosferina pueden ser hospitalizados.

¿Por qué se recomienda vacunar frente a la tosferina durante el embarazo?

Porque la vacunación de la madre durante el embarazo hace que ella produzca anticuerpos que llegan al feto a través de la placenta y que protejan más adelante al bebé durante los primeros meses, que son los de mayor riesgo, pues aún no han iniciado su calendario vacunal infantil.

En situaciones de alta circulación de tosferina como la que ocurriendo desde finales de 2023 hasta la actualidad, se produce un incremento de casos en todas las edades. Aunque el grupo más afectado está siendo el de 5-14 años, también se ha producido un aumento de los casos en los < 1 año.

Las vacunas disponibles frente a la tosferina proporcionan protección a corto plazo y la enfermedad mantiene sus ciclos epidémicos cada 3-5 años.

Vacunar frente a tosferina a la madre durante el embarazo es la medida más efectiva para la prevención de la tosferina grave en los niños más pequeños que aún no han sido vacunados.

¿Cuándo debo vacunarme?

El momento más adecuado es **entre la semana 27-28 de gestación**. Se ha comprobado que es el momento más adecuado para que el paso de anticuerpos al feto sea mayor. No obstante, si hay amenaza de parto prematuro la vacunación puede realizarse desde la semana 20.

Tengo el calendario de vacunación completo durante mi infancia. ¿Por qué debo vacunarme ahora?

Porque los anticuerpos frente a la tosferina disminuyen con el tiempo y no son suficientes para proteger al recién nacido.

Pasé la tosferina de pequeña. ¿Por qué debo vacunarme?

Porque haber pasado la tosferina no garantiza la inmunidad permanente ni que tengas defensas suficientes para pasárselas a tu futuro hijo.

¿Dónde tengo que acudir para vacunarme?

- Si tienes tarjeta sanitaria del sistema público (SACYL), deberás acudir a tu Centro de Salud, solicitando cita previa (principalmente serán las matronas de Atención Primaria quienes se encarguen de administrar la vacuna).
- Si estás hospitalizada, podrás recibir la vacuna durante la estancia en el hospital.

- Si tienes asistencia sanitaria exclusivamente privada, podrás acudir al centro de vacunación que corresponda en función de la provincia y/o aseguradora.

[Consultar en este enlace del Portal de salud](#)

¿Qué vacuna voy a recibir?

Recibirás la vacuna autorizada para uso en adultos, la vacuna dTpa (difteria-tétanos-tosferina) que además, protege frente a tétanos y difteria. La letra "p" en el nombre de la vacuna significa "pertussis", por el apellido de la bacteria que causa la tosferina: "Bordetella pertussis".

¿Cómo se administra?

La vacuna se aplica mediante inyección intramuscular en el brazo, en el músculo deltoides.

¿Es seguro vacunarme durante el embarazo?

Sí, es seguro. La vacuna dTpa es una vacuna inactivada, no contiene organismos vivos y, por tanto, no puede causar infección. Es una vacuna segura para la madre y para el feto.

¿Puedo vacunarme el mismo día frente a la gripe/COVID y tosferina?

Sí, las 3 vacunas pueden administrarse a la vez o en días distintos. Si vas a estar embarazada entre octubre y abril es recomendable que te vacunes de gripe y COVID-19, porque ambas enfermedades en el embarazo pueden causar complicaciones.

¿Qué reacciones adversas puedo tener?

Las vacunas, al igual que cualquier otro medicamento, pueden tener efectos secundarios. En la mayoría de las ocasiones son muy leves. Los efectos secundarios más frecuentes tras recibir la vacuna dTpa son reacciones locales en el lugar de la inyección (dolor, enrojecimiento e hinchazón) que habitualmente aparecen en las primeras 48 horas y no requieren ningún tratamiento.

Puedes aliviar estos síntomas aplicando frío en la zona, sin hacer presión. También podría aparecer cefalea, malestar general, fatiga o incluso fiebre de forma transitoria. Si no tienes ninguna contraindicación, puedes tomar paracetamol siguiendo las instrucciones del prospecto para aliviar estos síntomas, especialmente en caso de fiebre. Si tienes dudas o los síntomas no ceden, consulta siempre con un médico.

¿Qué más puedo hacer para proteger a mi bebé de la tosferina?

El riesgo de contraer la tosferina u otras enfermedades que se transmiten por contacto directo con secreciones respiratorias (al toser o estornudar) puede reducirse en gran medida con unos buenos hábitos de higiene en los contactos con el recién nacido:

- Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo desechable al toser o estornudar.
- Depositar el pañuelo usado en la basura.
- Toser o estornudar en la parte superior del brazo o en el codo.
- Lavarse las manos con agua y jabón a menudo por lo menos durante 20 segundos.
- Usar un desinfectante de manos de base alcohólica si no se dispone de agua y jabón.

También es importante que los bebés, muy especialmente los más pequeños, no estén en contacto con personas enfermas, incluso si el bebé o la madre están vacunados. Es extremadamente importante que **el recién nacido reciba su primera dosis de vacuna a los dos meses de vida**.