

**Indicadores PRAN por proceso: Neumonía**

Año y mes núm.	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Gerencia AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
GAP ÁVILA	251	74,48 %	337
GAP BURGOS	840	79,55 %	1.056
GAP LEÓN	550	73,63 %	747
GAP EL BIERZO	175	73,22 %	239
GAP PALENCIA	376	79,83 %	471
GAP SALAMANCA	472	71,73 %	658
GAP SEGOVIA	372	80,69 %	461
GAP SORIA	149	72,68 %	205
GAP VALLADOLID OESTE	643	79,48 %	809
GAP VALLADOLID ESTE	670	81,81 %	819
GAP ZAMORA	294	72,77 %	404
<b>TOTAL GRS</b>	<b>4.792</b>	<b>77,23 %</b>	<b>6.206</b>

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
A48.1	Enfermedad de los legionarios	3	66,67 %
J11.00	Gripe debida a virus de la gripe no identificado con tipo de neumonía no especificado	24	54,17 %
J12.82	Neumonía por enfermedad de coronavirus 2019	63	19,05 %
J12.9	Neumonía vírica, no especificada	6	50,00 %
J13	Neumonía por Streptococcus pneumoniae	49	85,71 %
J15.0	Neumonía por Klebsiella pneumoniae	1	100,00 %
J15.7	Neumonía por Mycoplasma pneumoniae	2	100,00 %
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	402	87,56 %
J17	Neumonía en enfermedades clasificadas bajo otro concepto	1	
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	279	76,70 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	5.336	77,49 %
J69.0	Neumonitis debida a inhalación de alimentos y vómito	42	57,14 %
J69.1	Neumonitis debida a inhalación de aceites y esencias	1	
J69.8	Neumonitis debida a inhalación de otros sólidos y líquidos	3	33,33 %
J82.81	Neumonía eosinofílica crónica	20	20,00 %
	<b>TOTAL PACIENTES Neumonía</b>	<b>6.232</b>	<b>77,23 %</b>

Grupos Edad	14 a 59	60 a 69	=+70
GAP ÁVILA	71,84 %	79,63 %	74,44 %
GAP BURGOS	76,07 %	79,17 %	81,10 %
GAP LEÓN	76,97 %	72,73 %	72,33 %
GAP EL BIERZO	74,32 %	67,57 %	73,64 %
GAP PALENCIA	86,33 %	77,00 %	77,16 %
GAP SALAMANCA	76,36 %	69,44 %	70,21 %
GAP SEGOVIA	80,30 %	72,09 %	83,74 %
GAP SORIA	67,31 %	62,50 %	77,59 %
GAP VALLADOLID OESTE	82,64 %	79,14 %	76,94 %
GAP VALLADOLID ESTE	84,03 %	81,05 %	80,32 %
GAP ZAMORA	77,55 %	66,67 %	72,43 %
<b>TOTAL GRS</b>	<b>78,95 %</b>	<b>75,33 %</b>	<b>76,68 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Subgrupos de mayor consumo	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
GAP ÁVILA	0,71 %	7,14 %			16,43 %		2,50 %	19,29 %	0,71 %	7,86 %	1,07 %	44,29 %
GAP BURGOS	0,10 %	3,91 %	0,20 %		23,37 %	0,10 %	3,81 %	22,67 %	1,50 %	12,54 %	0,60 %	31,19 %
GAP LEÓN	0,32 %	2,26 %			22,94 %		7,92 %	10,82 %	3,07 %	7,43 %	2,42 %	42,81 %
GAP EL BIERZO		3,59 %			34,87 %		1,03 %	8,21 %	2,56 %	10,26 %	0,51 %	38,97 %
GAP PALENCIA	0,23 %	4,33 %		0,23 %	16,40 %	0,23 %	1,59 %	22,55 %	1,82 %	9,79 %	1,82 %	41,00 %
GAP SALAMANCA	0,38 %	4,50 %			30,58 %		3,19 %	20,45 %	1,13 %	8,26 %	1,13 %	30,39 %
GAP SEGOVIA	0,22 %	8,63 %			24,78 %		0,88 %	12,17 %	1,99 %	13,05 %	0,88 %	37,39 %
GAP SORIA	0,56 %	4,44 %			20,00 %		6,11 %	22,22 %	2,78 %	13,33 %		30,56 %
GAP VALLADOLID OESTE		3,19 %			19,92 %		2,92 %	16,47 %	0,27 %	10,89 %	2,39 %	43,96 %
GAP VALLADOLID ESTE		3,10 %		0,26 %	18,50 %		1,29 %	21,35 %	1,68 %	10,22 %	1,94 %	41,66 %
GAP ZAMORA	0,28 %	3,60 %			22,44 %		3,88 %	22,44 %	4,16 %	11,36 %	1,39 %	30,47 %
<b>TOTAL GRS</b>	<b>0,20 %</b>	<b>4,14 %</b>	<b>0,04 %</b>	<b>0,05 %</b>	<b>22,32 %</b>	<b>0,04 %</b>	<b>3,24 %</b>	<b>18,56 %</b>	<b>1,77 %</b>	<b>10,48 %</b>	<b>1,45 %</b>	<b>37,71 %</b>