


Información para pacientes

Citisina para el tratamiento de la dependencia del tabaco

Citisina está indicada en adultos para el tratamiento de la dependencia tabáquica y reducción de la ansiedad de la dependencia a la nicotina en fumadores que estén dispuestos a dejar de fumar.

Al igual que otros tratamientos farmacológicos para la deshabituación tabáquica, en Sacyl su utilización se plantea en pacientes incluidos en el [Proceso Asistencial Integrado para la atención a las personas fumadoras](#). Es en la fase de acción cuando se valorará la posibilidad de iniciar tratamiento farmacológico.



Posología y forma de administración
















































































































































































La duración del tratamiento es de **25 días**.

Un envase de 100 comprimidos es suficiente para un ciclo de tratamiento completo.

Debe dejar de fumar a más tardar el 5.º día de tratamiento.

En caso de fracaso del tratamiento, este debe interrumpirse y podrá reanudarse después de 2 o 3 meses, aunque solo se financiará un tratamiento al año de cualquier fármaco para deshabituación.

Días de tratamiento	Dosis recomendada	Dosis diaria máxima
Del 1º al 3º día	1 comprimido cada 2 horas	6 comp.
Del 4º al 12º día	1 comprimido cada 2,5 horas	5 comp.
Del 13º al 16º día	1 comprimido cada 3 horas	4 comp.
Del 17º al 20º día	1 comprimido cada 5 horas	3 comp.
Del 21º al 25º día	1-2 comprimidos al día	2 comp.

nº de comprimidos al día	Posología en 12 horas	
1º día 6	      	cada 2 horas
2º día 6	      	
3º día 6	      	
4º día 5	      	cada 2,5 horas
5º día 5	      	
6º día 5	      	
7º día 5	      	
8º día 5	      	
9º día 5	      	
10º día 5	      	
11º día 5	      	
12º día 5	      	
13º día 4	      	cada 3 horas
14º día 4	      	
15º día 4	      	
16º día 4	      	
17º día 3	      	cada 5 horas
18º día 3	      	
19º día 3	      	
20º día 3	      	
21º día 2	      	cada 6 horas
22º día 2	      	
23º día 2	      	
24º día 2	      	
25º día 2	      	

- ✓ Solo debes tomar citisina si tienes la **firme intención de dejar de fumar**.
- ✓ **No debes seguir fumando ni usar productos que contengan nicotina mientras estés con el tratamiento**, porque esto podría provocar reacciones adversas más graves.
- ✓ La posología es compleja y exigente. **Asegúrate de que has comprendido la forma de tomarla.**