DEL 4 AL 6 DE MAYO DE 2017

PALACIO MUNICIPAL DE CONGRESOS DE MADRID



PRÓXIMA ESTACIÓN

Medicina

Familiar y

VIABILIDAD EN LA PRÁCTICA ASISTENCIAL ACTUAL DE UNA INTERVENCIÓN (BREVE) PARA LA DESHABITUACIÓN DE CONSUMIDORES CRÓNICOS DE BENZODIACEPINAS

Tomás Maté Enríquez, María del Carmen García Casas, Katty Viviana Yánez Cabrera,

Ana María Ruiz San Pedro, María Ana Prado Prieto, María de Lluch Bennasar Matesanz





Gerencia de Atención Primaria de Valladolid Este











VIABILIDAD EN LA PRÁCTICA ASISTENCIAL ACTUAL DE UNA INTERVENCIÓN (BREVE) PARA LA DESHABITUACIÓN DE CONSUMIDORES CRÓNICOS DE BENZODIACEPINAS

OBJETIVO

Analizar la cantidad de tiempo invertido en una intervención exitosa en lograr la deshabituación de consumidores crónicos de BZD, para valorar su viabilidad en las condiciones actuales de presión asistencial en Atención Primaria.

Resultado principal del ensayo clínico:

La deshabituación del consumo crónico de BZD (abstinencia mantenida durante 3 meses) se asoció de manera significativa (NNT=2,1; OR ajustada=19,67 [IC95%=7,45-51,93]) a la intervención.













VIABILIDAD EN LA PRÁCTICA ASISTENCIAL ACTUAL DE



CONSUMIDORES CRÓNICOS DE BENZODIACEPINAS

MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño: Ensayo clínico por conglomerados (ocho cupos de 2 centros de salud urbanos) CEIC-VA-ESTE-HCUV (PI-15-277).



Intervención: Carta + entrevista \pm deshabituación.



Control: Práctica clínica habitual.



Población: Seguimiento del grupo intervención

(91 sujetos).



Periodo: Noviembre/2015 a abril/2016.



Duración: 5 meses.





VIABILIDAD EN LA PRÁCTICA ASISTENCIAL ACTUAL DE



MATERIAL Y MÉTODOS

Variables: Nº total de citas por paciente, tiempos invertidos (entrevista inicial + demandas sucesivas).















VIABILIDAD EN LA PRÁCTICA ASISTENCIAL ACTUAL DE UNA INTERVENCIÓN (BREVE) PARA LA DESHABITUACIÓN DE CONSUMIDORES CRÓNICOS DE BENZODIACEPINAS

| | DESHABITUACIÓN | | |
|----------------|----------------|-----------|-------|
| | SÍ (N=50) | NO (N=41) | p |
| Nº total citas | 1 (IQR=1) | 5 (IQR=5) | 0,000 |














VIABILIDAD EN LA PRÁCTICA ASISTENCIAL ACTUAL DE UNA INTERVENCIÓN (BREVE) PARA LA DESHABITUACIÓN DE CONSUMIDORES CRÓNICOS DE BENZODIACEPINAS

| | DESHABITUACIÓN | | - |
|--|------------------|------------------|-------|
| | SÍ (N=50) | NO (N=41) | p |
| Nº total citas | 1 (IQR=1) | 5 (IQR=5) | 0,000 |
| Tiempo 1 ^{era} cita (minutos) | 31,72 (SD=10,24) | 35,61 (SD=10,91) | 0,083 |













VIABILIDAD EN LA PRÁCTICA ASISTENCIAL ACTUAL DE

UNA INTERVENCIÓN (BREVE) PARA LA DESHABITUACIÓN DE CONSUMIDORES CRÓNICOS DE BENZODIACEPINAS














VIABILIDAD EN LA PRÁCTICA ASISTENCIAL ACTUAL DE UNA INTERVENCIÓN (BREVE) PARA LA DESHABITUACIÓN DE CONSUMIDORES CRÓNICOS DE BENZODIACEPINAS

| 1 | | |
|--------------|--|--|
|) | | |
| | | |
| \mathbf{a} | | |





| | DESHABITUACIÓN | | 1 |
|--|------------------|------------------|----------|
| | SÍ (N=50) | NO (N=41) | p |
| Nº total citas | 1 (IQR=1) | 5 (IQR=5) | 0,000 |
| Tiempo 1 ^{era} cita (minutos) | 31,72 (SD=10,24) | 35,61 (SD=10,91) | 0,083 |
| Tiempo total citas sucesivas (minutos) | 25,31 (SD=23,78) | 43,79 (SD=28,20) | 0,043 |







semFYC

VIABILIDAD EN LA PRÁCTICA ASISTENCIAL ACTUAL DE

UNA INTERVENCIÓN (BREVE) PARA LA DESHABITUACIÓN DE CONSUMIDORES CRÓNICOS DE BENZODIACEPINAS
















VIABILIDAD EN LA PRÁCTICA ASISTENCIAL ACTUAL DE UNA INTERVENCIÓN (BREVE) PARA LA DESHABITUACIÓN DE CONSUMIDORES CRÓNICOS DE BENZODIACEPINAS












| | DESHABITUACIÓN | | |
|--|---|------------------|-------|
| | SÍ (N=50) | NO (N=41) | p |
| Nº total citas | 1 (IQR=1) | 5 (IQR=5) | 0,000 |
| Tiempo 1 ^{era} cita (minutos) | 31,72 (SD=10,24) | 35,61 (SD=10,91) | 0,083 |
| Tiempo total citas sucesivas (minutos) | 25,31 (SD=23,78) | 43,79 (SD=28,20) | 0,043 |
| Tiempo total intervención (minutos) | 38,30 (SD=20,16) | 70,85 (SD=35,61) | 0,000 |
| | Diferencia medias: 32,55 (IC95%: 20,05–45,05) | | |

VIABILIDAD EN LA PRÁCTICA ASISTENCIAL ACTUAL DE

UNA INTERVENCIÓN (BREVE) PARA LA DESHABITUACIÓN DE CONSUMIDORES CRÓNICOS DE BENZODIACEPINAS

RESULTADOS





S_OMaMFyC

Supresión completa del consumo de BZD >= 3 meses

VIABILIDAD EN LA PRÁCTICA ASISTENCIAL ACTUAL DE

UNA INTERVENCIÓN (BREVE) PARA LA DESHABITUACIÓN DE CONSUMIDORES CRÓNICOS DE BENZODIACEPINAS

CONCLUSIONES

El tiempo total invertido, alargado s las demandas sucesivas, fue menor sexo (mujer) en los que la intervención tuvo éxit Estado civil ésta difícilmente parece viable en la (casado/en pareja) actuales si no se prioriza su aplicaci Patologías crónicas seleccionando a los potenciales res mediante otras variables que en el ensayo clínico también se asociaron al éxito de la intervención.

Factores asociados deshabituación

Grupo (intervención)

respiratorias

Dosis BZD basal/24 h (Diazepam 5 mg)







VIABILIDAD EN LA PRÁCTICA ASISTENCIAL ACTUAL DE

UNA INTERVENCIÓN (BREVE) PARA LA DESHABITUACIÓN DE CONSUMIDORES CRÓNICOS DE BENZODIACEPINAS

MUCHAS GRACIAS











María de Lluch Bennasar Matesanz, Irene Asenjo Cabrero, María del Carmen García Casas, Tomás Maté Enríquez, María Ana Prado Prieto, Joaquín Rodríguez Vilasó, Ana María Ruiz San Pedro, Arleen Tejada Solana, Katty Viviana Yánez Cabrera, María Mercedes Zambrano Vera

Gerencia de Atención Primaria de Valladolid Este

