

Prenatal (Embarazadas)	0 meses	2 meses	3 meses	4 meses	11 meses	12 meses							
<p>GRUPE</p> <p>COVID-19 Según campaña</p> <p>Según campaña</p> <p>TRIAxis</p> <p>dTpa tétanos, difteria, tosferina</p> <p>(25mm)</p> <p>Preferentemente semana 27 a 28</p>	<p>ESTACIONAL</p> <p>Beyfortus™ 50 mg / 0,5 ml Inyección</p> <p>Beyfortus™ 100 mg/mL Inyección</p> <p>(16mm)</p> <p>AcVRS Anticuerpo monoclonal frente a virus respiratorio sincitial</p>	<p>RotaTeq RV rotavirus</p> <p>Vaxelis HEXAVALENTE Hepatitis B, difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, haemophilus influenzae b</p> <p>(25/16mm)</p>	<p>RotaTeq RV rotavirus</p>	<p>De 6 a 23 meses</p> <p>RotaTeq RV rotavirus</p> <p>Vaxelis HEXAVALENTE Hepatitis B, difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, haemophilus influenzae b</p> <p>(25mm)</p> <p>Vaxneuvance™² VNC15 Neumocócica conjugada 15 Valente</p> <p>(25mm)</p> <p>BEXSERO Meningococo B</p> <p>(25mm)</p> <p>Nimenrix³ Meningococo ACYW</p> <p>(25mm)</p>	<p>GRUPE</p> <p>Según campaña</p> <p>Vaxelis HEXAVALENTE Hepatitis B, difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, haemophilus influenzae b</p> <p>(25mm)</p> <p>Vaxneuvance™² VNC15 Neumocócica conjugada 15 Valente</p> <p>(25mm)</p>	<p>M.M.R.vaxPro SRP (Triple Vírica) Sarampión, Rubéola, Parotiditis</p> <p>(16mm)</p> <p>BEXSERO Meningococo B #</p> <p>(25mm)</p> <p>Nimenrix Meningococo ACYW #</p> <p>(25mm)</p>							
<p>Vacunación campaña frente a Gripe según rango de edad. Estacional</p>													
<p>Vacunación campaña frente a Covid según rango de edad. Estacional</p>													
<table border="0"> <tr> <td data-bbox="35 773 281 1342"> <p>RECONSTITUIR</p> <p>VIA ORAL</p> <p>JERINGA PRECARGADA</p> <p>Administración vía intramuscular región deltoidea. </p> <p>Administración vía subcutánea cara externo/posterior del tríceps. </p> <p>Administración vía intramuscular región deltoidea. </p> <p>Administración vía intramuscular vasto externo del muslo. </p> <p>Administración vía oral. </p> <p>Administración vía intranasal (ambas fosas nasales). </p> <p>#. De 1 a 2 años administración intramuscular o subcutánea dependiendo de la masa muscular. </p> <p>1. VRS. Nacidos desde el 1 de abril del año en curso hasta el 31 de marzo del año siguiente en su primera temporada. Estacional. [$< 5 \text{ kg} \rightarrow 50 \text{ mg (dosis 0,5 ml)}$ / $> 5 \text{ kg} \rightarrow 100 \text{ mg (dosis 1 ml)}$].</p> <p>2. VNC15. En sustitución de VNC13. Nacidos a partir de 01/01/24. Se aplica al cumplir los 2 meses (01/03/24).</p> <p>3. Meningococo ACYW. A los 4 meses en sustitución e Meningococo C. Nacidos a partir de 01/01/24. Se aplica al cumplir los 4 meses (01/05/24)</p> </td> <td colspan="6" data-bbox="281 773 2026 1342"> <p>Más información disponible en el Portal de Salud de Castilla y León: http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/vacunaciones</p> <p>No olvides registrar adecuadamente cada vacuna administrada o documentada.</p> </td> </tr> </table>							<p>RECONSTITUIR</p> <p>VIA ORAL</p> <p>JERINGA PRECARGADA</p> <p>Administración vía intramuscular región deltoidea. </p> <p>Administración vía subcutánea cara externo/posterior del tríceps. </p> <p>Administración vía intramuscular región deltoidea. </p> <p>Administración vía intramuscular vasto externo del muslo. </p> <p>Administración vía oral. </p> <p>Administración vía intranasal (ambas fosas nasales). </p> <p>#. De 1 a 2 años administración intramuscular o subcutánea dependiendo de la masa muscular. </p> <p>1. VRS. Nacidos desde el 1 de abril del año en curso hasta el 31 de marzo del año siguiente en su primera temporada. Estacional. [$< 5 \text{ kg} \rightarrow 50 \text{ mg (dosis 0,5 ml)}$ / $> 5 \text{ kg} \rightarrow 100 \text{ mg (dosis 1 ml)}$].</p> <p>2. VNC15. En sustitución de VNC13. Nacidos a partir de 01/01/24. Se aplica al cumplir los 2 meses (01/03/24).</p> <p>3. Meningococo ACYW. A los 4 meses en sustitución e Meningococo C. Nacidos a partir de 01/01/24. Se aplica al cumplir los 4 meses (01/05/24)</p>	<p>Más información disponible en el Portal de Salud de Castilla y León: http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/vacunaciones</p> <p>No olvides registrar adecuadamente cada vacuna administrada o documentada.</p>					
<p>RECONSTITUIR</p> <p>VIA ORAL</p> <p>JERINGA PRECARGADA</p> <p>Administración vía intramuscular región deltoidea. </p> <p>Administración vía subcutánea cara externo/posterior del tríceps. </p> <p>Administración vía intramuscular región deltoidea. </p> <p>Administración vía intramuscular vasto externo del muslo. </p> <p>Administración vía oral. </p> <p>Administración vía intranasal (ambas fosas nasales). </p> <p>#. De 1 a 2 años administración intramuscular o subcutánea dependiendo de la masa muscular. </p> <p>1. VRS. Nacidos desde el 1 de abril del año en curso hasta el 31 de marzo del año siguiente en su primera temporada. Estacional. [$< 5 \text{ kg} \rightarrow 50 \text{ mg (dosis 0,5 ml)}$ / $> 5 \text{ kg} \rightarrow 100 \text{ mg (dosis 1 ml)}$].</p> <p>2. VNC15. En sustitución de VNC13. Nacidos a partir de 01/01/24. Se aplica al cumplir los 2 meses (01/03/24).</p> <p>3. Meningococo ACYW. A los 4 meses en sustitución e Meningococo C. Nacidos a partir de 01/01/24. Se aplica al cumplir los 4 meses (01/05/24)</p>	<p>Más información disponible en el Portal de Salud de Castilla y León: http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/vacunaciones</p> <p>No olvides registrar adecuadamente cada vacuna administrada o documentada.</p>												



...Y a partir de los 15 años

Aprovechar cualquier contacto con el medio sanitario o servicio de riesgos laborales para revisar el calendario de vacunación y realizar correcciones si es necesario



