

# Estudio del Covid-19 y otras infecciones respiratorias agudas

## Subestudio 2: Estudio retrospectivo de incidencia de COVID-19

Para Enfermeras centinelas del Programa de Vigilancia Integrada de la Gripe, en colaboración con los médicos de familia y pediatras del programa

### Nota 6: Dudas y respuestas

#### Sobre la muestra, citación y material

1. Cuando algún paciente rechace participar o no se localice, se debe sustituir por otro paciente de la misma semana epidemiológica (en la segunda columna del listado), con el fin de mantener la representatividad por semanas.
2. Consentimiento Informado: Hay que imprimir 2 copias que deben de ser firmadas, una se archivará y custodiará por la enfermera centinela y la otra será entregada al paciente.
3. Encuesta epidemiológica (cuestionario anexo 2):
  - Se pueden rellenar en el propio ordenador, grabarlas según las instrucciones y enviar por email a [redcentinela@icyl.es](mailto:redcentinela@icyl.es).
  - Se pueden imprimir para cumplimentar a mano y escanearla para enviar por email a [redcentinela@icyl.es](mailto:redcentinela@icyl.es), o enviar copia del original a través de la valija semanal al SS.TT. de Sanidad de la provincia.

\*El **número de registro** que aparece en la encuesta es el que aparece en la columna 1 del listado de pacientes.
4. Las etiquetas para identificar el tubo de muestra y volante son las mismas que se generan en el CS para otras muestras analíticas. También pueden ser usadas para identificar el cuestionario y el Consentimiento informado.

#### Sobre los test y la extracción

1. Si no se dispone de test rápidos en las consultas de pediatría, se solicitarán a la Gerencia correspondiente.
2. En el protocolo se indica que si el test rápido que se hace en los niños es positivo y el niño tiene 5 o más años de edad se solicitará a los padres el consentimiento para una extracción de sangre para serología por ELISA.  
No obstante, si los padres lo solicitan y firman el consentimiento, se pueden hacer la extracción para ELISA independientemente del resultado del test rápido.
3. El volante para la extracción sanguínea lo hará el médico de familia o pediatra centinela (o sustituto) con quien comparte el cupo la enfermera.
4. Para generar el volante de petición de analítica en MEDORA se puede usar el proceso clínico de IRA de la fecha del listado. Si no es posible, se puede abrir uno de actividades preventivas. En la pantalla de petición de analítica de MEDORA, en

serología, se marcará CORINAVIRUS SARS-COV-2 y en el apartado anotaciones: MUESTRA DE SALUD PÚBLICA- SEROLOGÍA COVID-19 -RED CENTINELA.

5. Los tubos que se deben usar son los que se usan para hacer serología (Tubos para bioquímica). Son los mismos que se vienen utilizando en la serología pre y postvacunal de gripe.
6. Para remitir las muestras al laboratorio de área se usa el mismo transporte que para la remisión de las analíticas normales. **Es muy operativo** hacer varias extracciones del estudio el mismo día.
  - 1) Las muestras se envían al laboratorio del hospital con las demás muestras, pero marcando lo mejor posible el tubo (rotulando según instrucciones), en el volante debe de ir escrito MUESTRA DE SALUD PÚBLICA-SEROLOGÍA COVID-19-RED CENTINELA (rotular la frase con un marcador para resaltarla). Podéis avisar al transporte que va una MUESTRA de SALUD PÚBLICA, para mayor información en la recepción.
  - 2) Si un paciente tiene hecho un test serológico previo **NO se excluye** del estudio.
    - a. Se le cita y se le hace la encuesta.
    - b. Si no tiene inconveniente, se repite el test (niños) o toma de muestra (adultos) para de serología, sobre todo si el previo es un test rápido. Estas dobles pruebas servirán para confirmar los títulos de anticuerpos o la disminución de anticuerpos en su caso.
    - c. En observaciones, añada la fecha del test previo, el tipo, el resultado y la marca comercial si era un test rápido.