ADMINISTRACIÓN DE VACUNAS CON EXTRACTOS DE ALÉRGENOS (INMUNOTERAPIA):

1 Preguntar:

Por su situación clínica. Retrasar la administración si padece:

-Crisis asmática.
-Infección de vias respiratorias.
-Fiebre.
-Afección cutánea severa.
-Hepatitis, tuberculosis activa o proceso infeccioso.
- Si triple vírica en los ultimos 10 días.
- Si inmunización otras enfermedades los últimos 7 días.
- Embarazo: Consulta con el alergólogo.
- No dos extractos en el mismo día.
- Si no se dispone de adrenalina 1/1000 en la proximidad.

2 Comprobar :

-La vacuna pertenece al paciente.

-La fecha de caducidad es correcta.

-El vial y la dosis a administrar son los correctos según la cartilla de seguimiento de la inmunoterapia del paciente.



3 Seleccionar:

El vial que corresponde y agitarlo suavemente.

4 Extraer:

La dosis mediante la jeringa desechable de 1 ml. con aguja subcutánea, purgando en el interior.



5 Aplicar:

El punto de aplicación será la cara posterior externa del brazo (en el pliegue tricipital) a media distancia entre el codo y el hombro.



6 Limpiar:

La zona de inyección con algodón o gasa y alcohol de 70º

7 Inyectar: POR VÍA SUBCUTÁNEA:

- Coger un pellizco de piel de la zona y pinchar en la base formando un ángulo de 45º con la superficie del brazo, la aguja estará con el bisel hacia arriba.

- Aspirar para asegurar que la aguja no está en un vaso sanguíneo. Si esto ocurre, sacar la aguja y repetir todo el proceso 7. Si todo está correcto, inyectar muy lentamente

- Esperar 5 segundos antes de retirar la aguja para evitar que salga lo inyectado.

- Presionar el punto de aplicación con un algodón o gasa sin realizar masaje para que la vacuna se quede depositada. Evitar el rascado.



8 Desechar:

Todo el material utilizado respetando estrictamente las normas de desecho de material biológico.
Nunca encapuchar de nuevo la aguja para evitar pinchazos accidentales.

9 Anotar:

En la cartlilla de seguimiento de la inmunoterapia, la fecha de la dosis , la cantidad administrada, vial y brazo donde se aplicó. Indicar la fecha de la próxima dosis.



10 Esperar:

El paciente debe esperar al menos 30 minutos bajo supervision médica.



En caso de necesitar ayuda contactar con:

- Servicio de alergia Hospital Universitario Rio Hortega:
  Tlf: 983420400 extensiones: 842016 y 842014
- Centro de Farmacovigilancia de Castilla y León:
  Tlf: 983263021

Dirección General de Salud Pública SACYL
Dirección de Enfermería Hospital Universitario Río Hortega
Facultad de Enfermería. Universidad de Valladolid.
Sociedad Castellano Leonesa de Alergia e Inmunología Clínica.
Patrocinador: ALK-Abello.