


Prenatal (Embarazadas)	0 meses	2 meses	3 meses	4 meses	11 meses	12 meses																																	
<p>GRUPE</p> <p>COVID-19 Según campaña</p> <p>Según campaña</p> <p>TRIAxis</p> <p>dTpa tétanos, difteria, tosferina</p> <p>(25mm)</p> <p>Preferentemente semana 27 a 28</p>	<p>ESTACIONAL</p> <p>1</p> <p>Beyfortus™ 50 mg / 0,5 ml Inyección</p> <p>Beyfortus™ 100 mg/mL Inyección</p> <p>(16mm)</p> <p>AcVRS</p> <p>Anticuerpo monoclonal frente a virus respiratorio sincitial</p>	<p>RotaTeq</p> <p>RV rotavirus</p> <p>+</p> <p>Vaxelis</p> <p>HEXAVALENTE Hepatitis B, difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, haemophilus influenzae b</p> <p>(25/16mm)</p> <p>+</p> <p>2</p> <p>Vaxneuvance™</p> <p>VNC15 Neumocócica conjugada 15 Valente</p> <p>(25/16mm)</p> <p>+</p> <p>BEXSERO</p> <p>Meningococo B</p> <p>(25/16mm)</p>	<p>RotaTeq</p> <p>RV rotavirus</p>	<p>De 6 a 23 meses</p> <p>RotaTeq</p> <p>RV rotavirus</p> <p>+</p> <p>Vaxelis</p> <p>HEXAVALENTE Hepatitis B, difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, haemophilus influenzae b</p> <p>(25mm)</p> <p>+</p> <p>2</p> <p>Vaxneuvance™</p> <p>VNC15 Neumocócica conjugada 15 Valente</p> <p>(25mm)</p> <p>+</p> <p>BEXSERO</p> <p>Meningococo B</p> <p>(25mm)</p> <p>+</p> <p>3</p> <p>Nimenrix</p> <p>Meningococo ACYW</p> <p>(25mm)</p>	<p>GRUPE</p> <p>Según campaña</p> <p>Vaxelis</p> <p>HEXAVALENTE Hepatitis B, difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, haemophilus influenzae b</p> <p>(25mm)</p> <p>+</p> <p>2</p> <p>Vaxneuvance™</p> <p>VNC15 Neumocócica conjugada 15 Valente</p> <p>(25mm)</p>	<p>Priorix</p> <p>SRP (Triple Vírica) Sarampión, Rubéola, Parotiditis</p> <p>(16mm)</p> <p>+</p> <p>BEXSERO</p> <p>Meningococo B #</p> <p>(25mm)</p> <p>+</p> <p>Nimenrix</p> <p>Meningococo ACYW #</p> <p>(25mm)</p>																																	
<p>Vacunación campaña frente a Gripe según rango de edad. Estacional</p> <p>Vacunación campaña frente a Covid según rango de edad. Estacional</p>																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>RECONSTITUIR</th> <th>VIA ORAL</th> <th>JERINGA PRECARGADA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Administración vía intramuscular región deltoidea.</td> <td>Administración vía subcutánea cara externo/posterior del tríceps</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Administración vía intramuscular región deltoidea</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Administración vía intramuscular vasto externo del muslo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Administración vía oral</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Administración vía intranasal (ambas fosas nasales)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>#. De 1 a 2 años administración intramuscular o subcutánea dependiendo de la masa muscular</p> <p>1. VRS. Nacidos desde el 1 de abril del año en curso hasta el 31 de marzo del año siguiente en su primera temporada. Estacional. [$< 5 \text{ kg} \rightarrow 50 \text{ mg (dosis 0,5 ml)}$] [$> 5 \text{ kg} \rightarrow 100 \text{ mg (dosis 1 ml)}$].</p> <p>2. VNC15. En sustitución de VNC13. Nacidos a partir de 01/01/24. Se aplica al cumplir los 2 meses (01/03/24).</p> <p>3. Meningococo ACYW. A los 4 meses en sustitución e Meningococo C. Nacidos a partir de 01/01/24. Se aplica al cumplir los 4 meses (01/05/24)</p> <p>Más información disponible en el Portal de Salud de Castilla y León: http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/vacunaciones</p> <p>No olvides registrar adecuadamente cada vacuna administrada o documentada.</p>							RECONSTITUIR	VIA ORAL	JERINGA PRECARGADA				Administración vía intramuscular región deltoidea.	Administración vía subcutánea cara externo/posterior del tríceps					Administración vía intramuscular región deltoidea						Administración vía intramuscular vasto externo del muslo						Administración vía oral						Administración vía intranasal (ambas fosas nasales)		
RECONSTITUIR	VIA ORAL	JERINGA PRECARGADA																																					
Administración vía intramuscular región deltoidea.	Administración vía subcutánea cara externo/posterior del tríceps																																						
Administración vía intramuscular región deltoidea																																							
Administración vía intramuscular vasto externo del muslo																																							
Administración vía oral																																							
Administración vía intranasal (ambas fosas nasales)																																							



Vacunación campaña frente a **Gripe** según rango de edad. **Estacional**

Vacunación campaña frente a **Covid** según rango de edad. **Estacional**

RECONSTITUIR **VIA ORAL** **JERINGA PRECARGADA**



- VPH9.** Dos dosis separadas mínimo 6 meses. Se aplica en mujeres nacidas a partir de 1994 y hombres nacidos a partir de 2011.
- VNC20.** Al cumplir los 65 años, nacidos a partir del 01/01/58 (ver actualización de recomendaciones abril 2024)
- HZ/su.** A los 65 y 80 años. Dos dosis separadas un mínimo de 8 semanas.
- Td.** A los 65, comprobación previa de estado vacunal y dosis administradas.



RECUERDA: PRIMERO REGISTRAR Y LUEGO VACUNAR!!



...Y a partir de los 15 años

Aprovechar cualquier contacto con el medio sanitario o servicio de riesgos laborales para revisar el calendario de vacunación y realizar correcciones si es necesario

