

CONTACTE CON SU ENFERMERA SI:

El apósito se encuentra húmedo o manchado.
Tiene dolor, enrojecimiento, inflamación o picor en la zona del catéter.

Se está produciendo un exudado purulento en la zona de punción.

El brazo del catéter se encuentra inflamado o no puede flexionar el codo.

Temperatura mayor a 38°C.

Sangra a través de la conexión del catéter.

Observa algún cambio respecto a la posición del catéter.

RETIRADA

La enfermera responsable será la encargada de su retirada cuando:

- Haya finalizado el tratamiento.
- Exista fallo del dispositivo.
- Ya no sea apropiado.
- Presente alguna complicación asociada al catéter.

Puede descargar **Cuidaven®**, una App con educación sanitaria para el cuidado de las personas con accesos vasculares, gratuita y desarrollada por enfermeras del Servicio Andaluz de Salud.

En el apartado de ciudadanía de la App, usted podrá encontrar vídeos de recomendaciones de cuidados para personas portadoras de catéteres venosos.

Para sistema IOS



Para sistema Android



MÁS INFORMACIÓN EN



Hospital Clínico Universitario de Valladolid
Tlf. **983 420 000**

Extensión:.....



www.saludcastillayleon.es/HCUValladolid/es



TENGO UN CATÉTER VASCULAR PERIFÉRICO ¿QUÉ DEBO SABER?



CENTROS COMPROMETIDOS CON LA EXCELENCIA EN CUIDADOS®




¿QUÉ TENGO INSERTADO?

Su dispositivo de acceso vascular consiste en un catéter corto insertado en una vena, para permitir la administración de diferentes tratamientos.

Se trata de un catéter flexible.

La inserción y el mantenimiento del dispositivo serán realizados por la enfermera.



RECOMENDACIONES

Informe a su enfermera de reacciones alérgicas previas, producidas por algún desinfectante o apósito.

La piel de alrededor del apósito se debe encontrar limpia, seca e hidratada.

No debe manipular el catéter.

Tenga cuidado con golpes en la zona o tirones del catéter.

Evite tomas de tensión arterial en el brazo que esté insertado el catéter.

La enfermera responsable, realizará la revisión del catéter y cambio de apósito cuando proceda.

MANTENIMIENTO EN DOMICILIO

Evite humedecer el apósito.

¿QUÉ **SÍ** PUEDO HACER?

- Puede llevar una vida prácticamente normal, evitando movimientos bruscos y repetitivos.
- Se puede duchar, cubriendo la zona con un plástico para evitar que se moje.
- Si se aplica crema hidratante, evite que entre en contacto con el apósito.

¿QUÉ **NO** PUEDO HACER?

- Levantar objetos pesados con el brazo portador del catéter.
- Cualquier actividad que provoque la inmersión en agua del catéter, como bañarse, nadar, etc.