

## Recomendaciones generales en atención hospitalaria

- No indique antibióticos después de la incisión y el drenaje de abscesos cutáneos sin complicaciones, a menos que exista una celulitis extensa. [Medicina de emergencia # 5](#)
- No recete antibióticos en adultos con bronquitis/asma y en niños con bronquiolitis. [Medicina de emergencia # 2](#)
- No use antibióticos rutinariamente en adultos y niños con dolor de garganta sin complicaciones. [Medicina de emergencia # 8](#)
- No use antibióticos en adultos y niños con otitis media aguda sin complicaciones. [Medicina de emergencia # 10](#)
- No trate la tos de adultos con antibióticos, incluso si dura más de 1 semana, a menos que se sospeche una neumonía bacteriana (la duración media de la tos viral es de 18 días). [Medicina respiratoria # 4](#)
- No prescriba antibióticos para la bacteriuria asintomática en pacientes no embarazadas. [Medicina hospitalaria # 2](#)
- No use antibióticos para las exacerbaciones agudas del asma sin signos claros de infección bacteriana. [Medicina respiratoria # 6](#)
- No ordene antibióticos perioperatorios más allá de un período postoperatorio de 24 horas para casos instrumentados no complicados en pacientes que no tienen un alto riesgo de infección o contaminación de la herida. La administración de una sola dosis preoperatoria para casos de columna vertebral sin instrumentación es adecuada. [Columna # 5](#)
- No use antimicrobianos para tratar la bacteriuria en adultos mayores, a menos que se presenten síntomas específicos del tracto urinario. [Geriatría # 1](#)
- No prescriba rutinariamente formas intravenosas de agentes antimicrobianos altamente biodisponibles para pacientes que pueden tomar y absorber medicamentos orales. [Enfermedad infecciosa # 1](#)
- No prescriba antimicrobianos alternativos de segunda línea a pacientes que informen reacciones no graves a la penicilina, ya que los betalactámicos son la terapia de primera línea recomendada. [Enfermedad infecciosa # 2](#)
- No recomiende antimicrobianos para tratar la bacteriuria en adultos mayores, a menos que se presenten síntomas específicos del tracto urinario. [Enfermería # 8](#)
- No use antimicrobianos para tratar la bacteriuria asintomática en los ancianos. [Urología # 4](#)
- No trate las infecciones del tracto urinario asintomáticas en pacientes con sonda urinaria. [Medicina física y rehabilitación # 1](#)

- No recomiende antibióticos para las infecciones que probablemente sean de origen viral, como una enfermedad similar a la influenza. [Enfermería: Infección y Control de Prevención # 2](#)