

Comparación de los criterios de clasificación de lupus eritematoso sistémico (LES) ([Lancet 2019; 393: 2332–43](#))

	ACR revisado 1997	SLICC 2012	EULAR / ACR *
Cutáneo	Erupción malar; discoide; fotosensibilidad y ulceración oral.	LECA; LECS; LECC; ulceración oral; y alopecia no cicatricial.	LECA: 6 puntos; LECS / DLE: 4 puntos; y alopecia / úlceras orales: 6 puntos.
Articulaciones	Artritis no erosiva > 2 articulaciones periféricas	Sinovitis > 2 articulaciones periféricas.	Artritis: 6 puntos.
Serositis	Pleuritis; Frote o roce pleural; Derrame pleural; y pericarditis.	Pleuritis; pleuritis > 1 día; frote o roce pleural; derrame pleural; pericarditis; dolor pericárdico > 1 día; y ECG con evidencia de derrame pericárdico.	Pericarditis aguda: 6 puntos; y derrame: 5 puntos.
Renal	Proteinuria > 0, 5 g/día; y moldes celulares	Proteínas en orina y creatinina de 24 h; 0, 5 g de proteínas/24 h; y cilindros de glóbulos rojos.	Clase III/IV: 10 puntos; clase II/V: 8 puntos; y proteinuria > 0, 5 g/día: 4 puntos.
Hematológico	< 100 000 células/μL; anemia hemolítica; leucopenia; linfopenia; y trombocitopenia.	< 100 000 células/μL: anemia hemolítica; leucopenia; linfopenia; y trombocitopenia.	Hemólisis autoinmune o trombocitopenia: 4 puntos; leucopenia: 3 puntos.
Neurológico	Convulsiones y psicosis.	Desorden neurológico.	Convulsiones: 5 puntos; psicosis: 3 puntos; y delirio: 2 puntos.
Inmunológico	ANA positiva; anti-dsDNA, anti-Sm o anticardiolipina.	ANA positiva; anti-dsDNA; anti-sm; antifosfolípido; anticuerpo; Complemento bajo y positividad del test Coombs directo (sin hemólisis).	Anti-Sm o anti-dsDNA: seis puntos

Los criterios EULAR/ACR aún no se han validado por completo y se consideran en fase de desarrollo. El requisito de clasificación para el ACR 1997 revisado fue de cuatro o más ítems. El requisito de clasificación para SLICC 2012 fue de 4 ítems (uno clínico y otro inmunológico) o nefritis lúpica con ANA o anti-dsDNA. El requisito de clasificación para EULAR/ACR fue de 10 puntos o más. ACR = Colegio Americano de Reumatología. SLICC = Clínicas Colaboradoras Internacionales de Lupus Sistémico. EULAR = Liga Europea contra el Reumatismo. LECA = lupus eritematoso cutáneo agudo. SECS = lupus cutáneo subagudo. LECC = lupus eritematoso cutáneo crónico. DLE = lupus eritematoso discoide. ECG = electrocardiograma. ANA = reactividad antinuclear. DsDNA = ADN de doble cadena. *Criterios de inclusión, título de anticuerpos antinucleares ≥1: 80.

De acuerdo con los criterios de Systemic Lupus International Collaborating Clinics (SLICC) 2012, la **nefritis por lupus** puede ser un criterio **independiente**. En **ausencia de nefritis**, se deben cumplir cuatro criterios, al menos uno de los cuales es clínico y uno inmunológico (p. Ej., presencia de autoanticuerpos o complemento bajo). Los criterios de la **Liga Europea contra el Reumatismo (EULAR)/Colegio Americano de Reumatología (ACR) para la clasificación de LES**, son solo para investigación, y tienen un criterio de inclusión de anticuerpos antinucleares (título ≥ 1: 80), y luego se aplica un peso numérico para otros criterios. Se requiere una puntuación acumulativa de 10 puntos o más para que un paciente se clasifique como que presenta LES.