



## INHIBIDOR DE LA REABSORCIÓN RENAL DE GLUCOSA

### Dapagliflozina

#### ●●●●● Indicaciones

Diabetes mellitus tipo 2.

#### ●●●●● Administración

10 mg una vez al día, con o sin alimentos. Los comprimidos deben tragarse enteros.

#### ●●●●● Reacciones adversas

Náuseas, mareos, erupciones exantemáticas, aumento de creatinina sérica o infecciones del tracto urinario. La más frecuente es la hipoglucemia, especialmente cuando se combina con insulina o sulfonilureas.

#### ●●●●● Interacciones

Puede necesitarse una dosis menor de insulina o de un secretagogo de insulina para disminuir el riesgo de hipoglucemia. Puede aumentar el efecto de diuréticos tiazídicos o del asa y aumentar el riesgo de deshidratación e hipotensión.

#### ●●●●● Precauciones

Insuficiencia renal o hepática, hipotensión, deshidratación y mayores de 65 años. Contraindicada en hipovolemia. En embarazo y lactancia se recomienda insulina. No se recomienda en pacientes tratados concomitantemente con pioglitazona por posible aumento del riesgo de cáncer de vejiga.

#### ●●●●● Valoración de la respuesta

Mejoría de los niveles de glucemia y HbA1c.

#### ●●●●● Información al paciente.-

Puede administrarse a cualquier hora del día, con o sin alimentos. Los comprimidos deben tragarse enteros. Ante olvido de una dosis, tomar cuanto antes, a menos que esté próxima la dosis siguiente. Nunca doblar la dosis.

Se recomienda monitorizar la función renal antes de iniciar dapagliflozina o tratamiento concomitante con medicamentos que puedan empeorar la función renal. Posteriormente, al menos una vez al año