

Tabla 1. **Efectos adversos de los antidepresivos** Adaptado de 1, 3, 6, 12, 16 y fichas técnicas

	Sedación	Insomnio/ agitación	Toxicidad gastroin- testinal	Efectos anticoli- nérgicos	Hipo- tensión ortostá- tica	Disfun- ción sexual	Aumen- to de peso	Letalidad en sobredosis	Efectos adversos específicos y otras considera- ciones
ATC (antidepresivos tricíclicos) *									
Amitriptilina	++	-	-	++	++	+	++	Alta	Arritmias. Contraindicado en postinfarto de miocardio
ISRS (inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina)									
Citalopram	+	+	+	-	-	++	-	Baja	Prolongación QT, Dmáx en ancianos y en IH: 20mg/día
Escitalopram	-	-	+	-	-	+	-	ND	Prolongación QT, Dmáx en ancianos y en IH: 10mg/día
Fluoxetina	+	+	+	-	-	++	-	Baja	Efecto anorexígeno y pérdida de peso
Fluvoxamina	++	-	++	+	+	++	-	Baja	ISRS con mayor potencial de interacciones
Paroxetina	+	-	+	+	+	++	+	Baja	Mayor incidencia de sudoración, sedación y síntomas de discontinuación que otros ISRS
Sertralina	+	-	++	+	+	++	-	Baja	Mayor incidencia de diarrea que otros ISRS
IRSN (inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina o "duales")									
Venlafaxina	+	-	++	+	+	++	-	Moderada	Hipercolesterolemia Dosis más altas: arritmias y aumento de la presión arterial Más riesgo de síntomas de retirada
Desvenlafaxina	-	-	++/+	+	+	+	+	ND	Hipercolesterolemia Dosis más altas: arritmias y aumento de la presión arterial
Duloxetina	-	+	++	-	-	++	-	Moderada	Hepatopatía, S. Stevens-Johnson Hiperglucemia en diabéticos Dosis más altas: arritmias y aumento de la presión arterial
Otros									
Mianserina	++	-	-	-	-	-	-	Baja	Discrasia sanguínea
Mirtazapina	++	-	-	-	-	-	++	Baja	Erupciones exantemáticas Mialgia
Agomelatina	-	-	-	-	-	-	-	ND	No indicado en mayores de 75 años. Hepatotoxicidad S. Stevens-Johnson. Comportamiento agresivo
Bupropión	-	+	+	-	-	-	-	Moderada	Estimulación del sistema nervioso central (insomnio, cefalea, temblor, disminución apetito, convulsiones) Hipertensión
Trazodona	++	-	-	+	+	-	+	Baja	Somnolencia y sedación Contraindicado en infarto reciente
Reboxetina	-	+	-	+	-	+/-	-	Baja	Insomnio, vértigo, estreñimiento, hipopotasemia No recomendado en ancianos (pocos datos)
Maprotilina	++	-	-	++	-	+	++	Alta	Arritmias. Contraindicado en: postinfarto, epilepsia

-: raramente; +: ocasionalmente; ++: frecuentemente; ND: no disponible. IH: insuficiencia hepática. Dmáx: dosis máxima.

* Entre los antidepresivos tricíclicos se incluye sólo amitriptilina, ya que el consumo del resto de principios activos es bajo.

No se incluyen vortioxetina ni tianeptina, debido a la escasa información comparativa existente frente a otros antidepresivos.